

## **POOPERAČNÍ PÉČE**

### **1. umístění zvířete**

- po operaci může přetrvávat u vašeho zvířete ospalost a neochota k pohybu po dobu 24–36 hodin. Po tuto dobu umístěte pacienta na klidné suché místo bez průvanu, s optimální teplotou prostředí 15–25 °C. Vždy je lepší mít zvíře pod dohledem v místnosti.
- nenechávejte zvíře na vyvýšeném místě - zamezíte tím pádu a poranění

### **2. kontrola sliznic**

- během 12 hodin po operaci kontrolujte sliznice psa
- barva sliznic by měla být růžová až slabě červená
- po stlačení tvářové sliznice zmizí barva, její návrat by měl být do dvou až tří sekund

### **3. voda**

- po příchodu domů (pokud je pacient zcela při vědomí) nabídněte malé množství čerstvé vody, toto proveďte několikrát za hodinu
- nenechte vašeho psa vypít velké množství vody najednou – nebezpečí zvracení
- neomezený přístup k vodě umožněte za 2–4 hodiny po prvním podání tekutin

### **4. potrava**

- potravu nabídněte za 5–10 hodin po operaci za předpokladu, že pacient nezvrací
- podávejte malé množství stravitelné potravy
- u štěňat a velmi malých plemen psů začněte podávat potravu co nejdříve
- k normálnímu stravovacímu režimu přejděte 24 hodin po operaci (pokud neurčí lékař jinak)
- potrava by měla být stravitelná, bohatá na aminokyseliny a energii

### **5. pohybová aktivita**

- do vytažení stehů výrazně omezte pohyb pacienta
- procházky by měly probíhat jen na vodítku
- zamezte výskokům a seskokům

### **6. ochrana operační rány**

- je nutné zabránit olizování operační rány – nebezpečí zavlečení infekce a předčasné odstranění stehů
- použijte ochranné límce, ochranné bandáže nebo oblečku. Je možné také využít náhubek vypletený z přední strany prodyšným materiálem.

### **7. kontrola operační rány**

- mírný otok, bolestivost a zarudnutí je v prvních dvou dnech normální
- z rány nesmí vytékat žádný sekret
- po dobu hojení rány psa nekoupejte
- stehy se obvykle vytahují za 10–12 dní, neurčí-li lékař jinak

### **8. tlumení bolesti**

- nepodávejte léky určené pro lidi typu Ibalgin, Acylpyrin, Paralen, Dyklofenac a další – nebezpečí žaludečních vředů, selhání ledvin a krvácivých stavů

#### **KDY KONTAKTOVAT VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE**

- při prodlouženém probouzení (trvajícím déle než 12 hodin)
- při změně barvy sliznic – šedá, porcelánově bílá
- pokud se objevilo opakované zvracení
- pokud pacient odmítá vodu a krmivo déle jak 24 hodin, u štěňat a toy plemen 12 hodin
- pokud je operační rána oteklá, červená, krvácí nebo prosakuje a mokvá
- při výskytu větší bolestivosti, nařikání a změn chování zvířete